

Scheda di eleggibilità paz

1- Scheda Registrazione paziente (RP)		
E	Età (anni)	>12
O	Genere	F/M
2- Scheda Eleggibilità e Dati Clinici (EDC)		
E	Positività tramite test molecolare o test antigenico di terza generazione per SARS-CoV-2	Si No
O	Data del test	.././.... <i>blocca</i>
E	Data esordio dei sintomi da COVID-19	.././.... <i>blocca se [data valutazione - data esordio sintomi] &gt;10 gg</i>
E	Sintomi da COVID-19 di grado lieve-moderato?	Si No <i>blocca</i>
O	Selezionare almeno uno di questi sintomi da COVID-19	Febbre Tosse Ageusia/disgeusia Anosmia Faringodinia Astenia Cefalea Mialgie Sintomi gastrointestinali Dispnea Tachipnea <i>selezione multipla</i>

O	Il paziente necessita di ossigenoterapia cronica per sottostanti comorbidità non correlate al COVID-19	Si No
E	Se SI alla domanda sopra, ha avuto bisogno di un incremento di ossigeno a seguito dell'insorgenza del COVID-19	Si No <i>blocca</i>
E	Paziente in ossigenoterapia e/o soggetto a procedure di ventilazione meccanica per condizione correlata al COVID-19	Si No <i>blocca</i>
Se età <18 anni, si apre il campo sottostante		
E	Presenza di almeno una delle seguenti comorbidità	BMI ≥85* percentile per età e genere soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0% o 75 mmol/mol) o con complicanze croniche immunodeficienza primitiva immunodeficienza secondaria (con particolare riguardo a paziente oncoematologico in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure) anemia falciforme malattia cardiaca congenita o acquisita malattia del neurosviluppo dipendenza da dispositivo tecnologico (p.es. soggetto con tracheotomia, gastrostomia, etc.) asma o altra malattia respiratoria che richiede medicazioni giornaliere per il suo controllo <i>selezione multipla</i>

Se età ≥18 anni, si apre il campo sottostante		
E	Presenza di almeno una delle seguenti comorbidità ( <i>selezione multipla</i> )	BMI ≥35 Kg/m <sup>2</sup> soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi diabete mellito non controllato (HbA1c ≥9.0% o 75 mmol/mol) o con complicanze croniche immunodeficienza primitiva immunodeficienza secondaria (con particolare riguardo a paziente oncoematologico in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure) malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione arteriosa con danno d'organo) BPCO e/o altra malattia respiratoria cronica (fibrosi polmonare o paziente che necessita di O <sub>2</sub> -terapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2) <i>criteri di eleggibilità solo se età ≥55 aa</i>

